

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

■ LP 14-5-62 102328
BULLETIN
TECHNIQUE
DES STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 95-10 et 97-11, Postes 260 et 263)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DÔME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL
12 NF

Bulletin n° 20 de MAI 1962 (Bulletin n° 20 bis pour les départements de l'Allier et de la Corrèze)

A V E R T I S S E M E N T S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

TAVELURES (Poiriers - Pommiers). -

De graves infections primaires sont toujours possibles. Dans les Vergers traités jusqu'alors selon nos indications, assurer la continuité de la protection en réalisant un traitement dans les prochains jours.

CARPOCAPSE. - Les premières éclosions ont été notées dans certains de nos postes d'observations. Il est encore trop tôt pour intervenir.

V I G N E

BLACK-ROT. - Dans les Vignes intéressées par cette maladie (départements de l'Allier et de la Corrèze) effectuer un second traitement dès que possible.

I N F O R M A T I O N S . -

A R B R E S F R U I T I E R S

ARAIGNEES-ROUGES - PUCERONS - CHENILLES DEFOLIATRICES - OÏDIUM. -

Ne pas négliger la lutte contre ces parasites qui se manifestent en abondance par endroits.

V I G N E

CIGARIER. - Contre cet insecte qui enroule les feuilles en cigare, nous rappelons que les produits suivants sont efficaces : D.D.T., H.C.H., Lindane, Chlordane, Parathion, Aldrine.

ROT-BRENNER ou ROUGEOT PARASITAIRE. - (Région de THIERS - Puy-de-Dôme et de LAPALISSE - Allier).

Là où cette maladie est à redouter (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent) effectuer un traitement dès que la Vigne présente 3 à 4 feuilles bien étalées (utiliser une bouillie à base de Cuivre, de Zinèbe ou une spécialité à base de Zinèbe + Cuivre).

P./...43

MILDIOU.-

La date d'apparition et l'importance des foyers primaires de Mildiou constituant des indications précieuses au point de vue "Avertissements Agricoles", comme chaque année, une prime de 10 NF. sera attribuée aux premières personnes qui nous feront parvenir des feuilles attaquées. Les échantillons seront à adresser à la Station, entre 2 feuilles de papier buvard légèrement humectées au départ. Joindre les indications suivantes :

Nom, Prénom et adresse de l'expéditeur,
Lieu (bas-fond, coteau...) et date précise de la découverte
Cépage, âge de la vigne et mode de taille
Situation des feuilles attaquées (1ère, 2ème, 3ème feuille...)
Importance de l'attaque.

C U L T U R E S M A R A I C H E R E S . -

MOUCHE DE L'ASPERGE.-

Par beau temps, effectuer un traitement dans les jeunes aspergeraies non encore en production. (Pour les produits à utiliser, consulter la liste qui vous a été adressée).

C O L Z A

CHARANÇON DES SILIQUES.-

Dans la circonscription, ce ravageur n'a pas causé jusqu'alors de graves dégâts.

Si un traitement se justifiait par l'abondance de cet insecte dans certaines cultures, rappelons que, pendant la floraison, seuls les produits suivants reconnus comme non dangereux pour les Abeilles, peuvent être utilisés :

Chlorthiépín, Polychlorocamphanes, Pyréthrinés, Toxaphène.

CECIDOMYIE DES SILIQUES.-

Certaines cultures, par contre, sont fréquemment touchées par la Cécidomyie des Siliques (nombreuses petites larves dans les siliques).

Les traitements (mêmes produits que pour le charançon des siliques) seront limités au pourtour des pièces, sur une largeur de 20 à 30 mètres.- Intervenir, s'il y a lieu, à plusieurs reprises pendant la floraison à une dizaine de jours d'intervalle.

Clermont-Ferrand, le 10 Mai 1962.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles.

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux.

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de Clermont-Ferrand

Directeur-Gérant : L. BOUYX.